

## Botox-hoito röntgenissä ennen tyräleikkausta

Sinulla on todettu tyrä, jota varten olet saanut sinua hoitavasta yksiköstä ajan leikkausta varten.

Ennen leikkausta sinulle on tarkoitus laittaa röntgenissä botuliinia eli Botoxia vatsalihaksiin.

Röntgenissä tehtävällä hoidolla on tarkoitus tilapäisesti heikentää vinojen vatsalihasten toimintaa 2–4 viikkoa ennen leikkausta. Tämä helpottaa tyräleikkauksen tekemistä.

### **Ilmoittaudu röntgenissä 15 minuuttia ennen sinulle annettua toimenpideaika.**

Varaa toimenpiteessä käyntiin aikaa noin 1 tunti.

Toimenpide kestää yleensä 20 minuuttia. Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Saapumisohjeessa on yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä.

Jos sinusta on pyydetty otettavaksi verinäytteitä, käy laboratoriossa 2-7 päivää ennen tutkimusta.

### **Ennen toimenpidettä**

Sinun ei tarvitse valmistautua toimenpiteeseen.

### **Toimenpiteen aikana**

Toimenpiteen ajaksi riisut paidan pois. Toimenpiteen aikana makaat selälläsi tai hieman kyljellään tutkimuspöydällä.

Röntgenlääkäri etsii ultraäänilaitteen avulla vinot vatsalihakset, ja laittaa lihaskerroksiin ohuella neulalla Botoxia.

Pistoksia laitetaan yhteensä 6 pistosta, 3 pistosta sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

Pistoksesta tulleet pienet reiät peitetään laastareilla.

Botoxin lihaksia lamaava vaikutus alkaa vähitellen, ja on voimakkaimmillaan sinulle suunniteltuna leikkausajankohtana.

### **Toimenpiteen jälkeen**

- Pidä pistokohdat kuivina 1 vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen. Älä esimerkiksi käy suihkussa, sauno tai ui.
- Ota laastarit pois 1 vuorokauden kuluttua.
- Vältä fyysistä rasitusta 1 vuorokauden ajan. Älä esimerkiksi käy kuntosalilla tai kannan painavaa kauppakassia.

## Ota huomioon

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.